


# WEST NILE DISEASE

La West Nile Disease (WND), è causata da un virus che alberga negli uccelli selvatici e che può essere trasmesso attraverso la puntura di zanzara a mammiferi, uccelli, rettili. In rari casi l'uomo può contrarre il virus, ma non può contagiare altre persone.



REGIONE CAMPANIA

## TRASMISSIONE DEL VIRUS



IL VIRUS PUÒ ESSERE TRASMESSO ALL'UOMO SOLO DALLA ZANZARA O DA EMODERIVATI



## SINTOMI NELL'UOMO

80%

NESSUN SINTOMO

20%

MALATTIA SIMIL-INFLUENZALE (FEBBRE, MAL DI TESTA, NAUSEA, VOMITO, LINFONODI INGROSSATI, SFOGHI CUTANEI)

-1%

SINTOMI NEUROLOGICI. NELLO 0,6% DEI CASI, IL VIRUS PROVOCA GRAVI FORME NEUROLOGICHE (ENCEFALITE, MENINGOENCEFALITE O PARALISI FLACCIDA)

## PREVENZIONE



Coprire le cisterne e i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere



All'aperto utilizzare repellenti contro gli insetti



Trattare con prodotti larvicidi, ogni 15 giorni circa, tombini e pozzetti di sgrondo delle acque piovane, zone di scolo e ristagno



Schermare porte e finestre con zanzariere



Eliminare da stabili e abitazioni eventuali ripari dove possono annidarsi volatili infetti



Rimuovere fonti di acqua stagnante. Cambiare spesso l'acqua delle ciotole per animali



Verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite



Tenere le piscine per i bambini vuote e coperte quando non sono in uso

## COSA FARE??

SE HAI UNO DEI SINTOMI SOPRA MENZIONATI RIVOLGITI AL TUO MEDICO O PEDIATRA .  
SE RINVIENI VOLATILI MORTI CHIAMA AL NUMERO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE:

C.Re.San

800232525



Protezione Civile  
Regione Campania

se trovi uno di questi uccelli ferito o morto contatta il servizio veterinario della ASL

**Numero verde: 800232525**

cornacchie, corvi, ghiandaie, storni, merli, gazze, falchi, falchetti, gufi, allocchi, civette barbagianni, rondini, rondoni..



Diventerai così parte attiva nella **SORVEGLIANZA** per la WEST NILE DESEASE

Il primo modo per difendersi è ridurre il numero di vettori in circolazione:

negli **spazi privati** il cittadino o gli amministratori di condominio devono **SISTEMATICAMENTE** eliminare tutte le raccolte di acqua stagnante che rappresentano l'ambiente di ovodeposizione della zanzara (focolai larvali):

- secchi o altri contenitori, grondaie, sottovasi, abbeveratoi per animali, pneumatici o altro materiale accantonato ed altro dove possa ristagnare acqua, ogni 3/4gg o, devono essere svuotati o, quando non possibile, trattati con larvicidi.
- le piscine non in uso devono essere coperte
- gli spazi verdi devono essere periodicamente puliti ed il materiale di sfalcio non accumulato in zone esposte

negli **spazi pubblici** le Amministrazioni Comunali:

- i cantieri, le aree dismesse, i piazzali di deposito, i parcheggi, i vivai, gli orti urbani ma anche nelle attività produttive e commerciali devono essere sgomberati da materiale abbandonato ove possa ristagnare acqua;
- tombini e caditoie, ma anche fontane, laghetti, grondaie o altri ristagni d'acqua presenti in parchi, giardini e cimiteri devono essere periodicamente puliti e liberati da raccolte di acqua stagnante
- i potenziali focolai larvali che non possono essere trattati con misure gestionali devono essere periodicamente trattati con larvicidi

# Come prevenire le punture di zanzare

## Prevenzione

Dal momento che ad oggi non sono disponibili vaccini o terapie preventive, l'unico modo per evitare l'infezione è prevenire la puntura delle zanzare, prestando particolare attenzione nelle ore serali/notturne.

Ecco alcuni suggerimenti:



- indossa **abiti di colore chiaro** che coprano la maggior parte del corpo;



- usa **repellenti cutanei** sulla pelle esposta, seguendo attentamente le indicazioni riportate nella confezione. Chiedi al tuo farmacista qual è il prodotto più adatto alle tue esigenze;



- proteggi la tua casa con zanzariere a porte e finestre;
- elimina l'acqua stagnante da sottovasi, secchi, bidoni, ciotole per animali, piscine inutilizzate, per impedire la proliferazione delle zanzare;



- proteggiti durante il sonno dotando il tuo **letto** di una **zanzariera**;



- in casa utilizza spray a base di piretro e altri insetticidi per uso domestico oppure diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi e seguendo attentamente le istruzioni per l'uso;



- proteggiti durante le attività all'aperto nel tardo pomeriggio, soprattutto lungo i corsi d'acqua e i canali, le visite ai cimiteri, lavori negli orti, ecc.

# WEST NILE



**Nessun contagio diretto tra uomo e uomo: il virus si trasmette solo tramite i vettori (zanzare) .**

Nella maggior parte dei casi l'infezione è asintomatica o causa sintomi lievi come:

- Febbre
- Mal di testa
- Nausea
- Vomito

**La sintomatologia regredisce in breve tempo  
Non occorre il ricovero ospedaliero**

Vanno protetti:

- Persone anziane
- Persone con disturbi immunitari
- Persone con patologie croniche (tumori diabete ipertensione malattia renale)
- Persone sottoposte a trapianto



**Se dopo una puntura di zanzara compare febbre alta e mal di testa associate a:**

- rigidità del collo
- stato stuporoso
- disorientamento
- tremori
- convulsioni
- debolezza muscolare
- perdita della vista
- intorbidimento
- paralisi

**rivolgiti immediatamente al medico o recati in una struttura ospedaliera**